

Version 01.2024

## APPÂT RODENTICIDE À BASE DE BRODIFACOUM

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **SUPPORT** : Céréales
- **SUBSTANCE ACTIVE** : 0.0025% brodifacoum
- **AMÉRISANT** : 0.001% de dénatonium benzoate
- **NUMÉRO AMM** : FR-2019-0048
- **CONDITIONNEMENT** : seau de 5kg

### PROPRIÉTÉS :

- Anticoagulant.
- Agit par ingestion répétée.
- Antidote : vitamine K1 par du personnel médical / vétérinaire uniquement.
- TP14.

### DOMAINE D'UTILISATION :

- Traitement à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments, en zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries.

### MODE D'EMPLOI :

- Lutte contre les rats :
  - forte infestation : 100g par **DUOMATRAT** espacé de 5m.
  - faible infestation : 100g par **DUOMATSOURIS** espacé de 10m.
- Lutte contre les souris :
  - forte infestation : 40g par **DUOMATRAT** espacé de 1m.
  - faible infestation : 40g par **DUOMATSOURIS** espacé de 2m.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début de traitement et au moins 1 fois par semaine par la suite.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement. Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. Protéger l'appât des conditions atmosphériques.
- Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non ciblées.
- Vérifier régulièrement la consommation et renouveler les appâts consommés ou souillés jusqu'à ce que la consommation cesse.
- Retirer les appâts en fin de traitement et ne retraiter qu'en cas de nouvelle infestation.
- Ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

**Utilisez les rodenticides avec précautions.  
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et  
les informations concernant le produit.**

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**